

DESCRIPTION DE DEUX ESPÈCES NOUVELLES D'ARACHNIDES  
RECUÉILLIES DANS LE SAHARA PAR LE DR R. BLANCHARD,

par Eugène SIMON,

Ancien Président de la Société.

*CERCIDIA DECORA*, sp. nov.

♀ long. 4<sup>mm</sup>.— Cephalothorax niger, nitidus, setis longis albis parce hirsutus, parte cephalica angusta, elevata. Oculi postici subaequales, lineam subrectam levissime recurvam formantes. Oculi antici inter se fere aequidistantes, medii reliquis paulo minores, lineam leviter procurvam formantes. Clypeus area oculorum tota paulo latior, sub oculis leviter depresso. Abdomen ovatum, nigrum, parce et longe albo-setosum, albo-maculatum : antice maculis ovatis maximis et obliquis, prope medium maculis binis subrotundis, postice maculis multo minoribus biseriatis (2-2 vel 3-3) et prope apicem macula media parva. Venter niger, antice utrinque ad angulum epigasteris minute testaceo-notatus. Sternum nigrum sublaeve. Chelæ et partes oris nigrae. Pedes fulvo-rufescentes vel coccinei, coxis femoribus patellisque 1<sup>i</sup> paris omnino nigris, femoribus 2<sup>i</sup> paris apice nigricantibus, aculeis longis et gracilibus armati, metatarsis cunctis prope medium biaculeatis. Tuberculum vulvae humile, nigrum, lœve et transversum, antice in medio levissime emarginatum.

Cette espèce a été trouvée à Biskra par le Dr R. Blanchard. Nous l'avions reçue antérieurement de Teniet-el-Haad (L. Bedel) et nous l'avions observée à Biskra, à Bou-Saada, sur le territoire des Ouled Anteurs près Boghari, aux sources du Bou-Merzoug et à Hammam-Meskoutin, dans le département de Constantine.

*GALEODES BLANCHARDI*, sp. nov.

♂ ♀ long. 28-33<sup>mm</sup>. — Lurido-testaceus, abdomine immaculato, pedum-maxillarium tibia metatarsoque, apice excepto, nigricantibus, chelis supra lineis binis obscurioribus parum expressis notatis, unguibus rufescensibus apice nigris. — Pars cephalica latior quam longior, nec striata nec impressa, antice fere recte secta, setis validis inaequalibus conspersa. Tuber oculorum utrinque nigrum, canaliculatum, spatio inter oculos diametrum oculum circiter aequante. Chelæ parce et longe erinitæ, ungue superiore arcuato, haud sinuoso, stipa breviore, serie dentium in femina ex

dentibus novem composita : dentibus 3<sup>o</sup> et 5<sup>o</sup> reliquis majoribus, dente 9<sup>o</sup> minore, reliquis inter se subaequalibus, in mare dentibus 1<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> inter se coalitis et carinam sinuosam formantibus, ungue inferiore (mobili) tridentato, dente 1<sup>o</sup> mediocri, 2<sup>o</sup> minore, 3<sup>o</sup> reliquis multo majore. Pedum-maxillarium femur, et subtus et intus, numerosissime et longissime aculeatum, tibia metatarsusque subtus aculeis longissimis sed inaequalibus, series duas, basin articulorum attingentes, formantibus, instructa. (Metatarsus 10-10 tibia saltem 8 8 aculeata), tarsi 4<sup>i</sup> paris spinis sex armati (articulo 1<sup>o</sup> sp. 4, art. 2<sup>o</sup> sp. 2). Abdominis segmenta ventralia 2<sup>um</sup> et 3<sup>um</sup> ad marginem posticum carina crebre et regulariter serrata munita. — ♂ Chelarum flagellum simplex, gracile et acutissimum, in parte apicali anguste lanceolatum. Tarsorum 4<sup>i</sup> paris articuli 1<sup>us</sup> et 2<sup>us</sup> setis depresso, leviter fusiformibus, elongatis et acutis, subtus crebre vestiti.

Cette espèce a été trouvée par M. le Dr R. Blanchard, à Kef-el-Dor, sur la rive nord-ouest du chott Melrir ; elle avait été déjà observée dans la même localité par M. le Dr Ch. Martin. Elle s'y trouve en même temps que *Galeodes Olivieri* E. Sim., *Solpuga flavescens* C. Koch, *S. aciculata* E. Sim., et *Gluvia kabiliana* E. Sim.

*Galeodes Blanchardi* diffère des *G. barbarus* Lueas, *occidentalis* E. Sim. et *renator* E. Sim., par les longues épines du métatarses de sa patte-mâchoire, l'absence de bande noire à l'abdomen et, chez le mâle, l'absence d'épines baciliformes au 5<sup>e</sup> segment ventral. Il diffère des *G. araneoides* Pallas et *græcus* C. Koch par la présence de six épines (au lieu de huit) aux tarses de la quatrième paire, et de *G. Olivieri* E. Sim. par ses pattes-mâchoires à tibia et métatarses rembrunis et ses tarses postérieurs garnis en dessous, chez le mâle, de soies lancéolées-aiguës nullement squamiformes.